



ISTITUTO COMPENSIVO  
SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI I GRADO

"Eduardo De Filippo" C. M. BNIC819003

ISTITUTO COMPENSIVO  
"EDUARDO DE FILIPPO"

email - bnic819003@istruzione.it - bnic819003@pec.istruzione.it web:

www.icmorcone.edu.it CF: 920 290 70 627

04 DIC 2023 Via Santa Maria del Giglio, 3 – tel. 0824 956054 - 82026 MORCONE (BN)

*Al Personale Docente e non Docente*

*Pro. 5518-48 Alle Famiglie delle alunne ed alunni di Scuola dell'Infanzia - Plesso di Cuffiano*

*Alla DSGA*

*All'Albo Pretorio/ Sito istituzionale*

**Oggetto: Segnalazione casi di scarlattina -Plesso di Cuffiano - INFANZIA**

A seguito di segnalazione di casi di scarlattina, verificatisi presso la Scuola dell'Infanzia-Plesso di Cuffiano, si richiamano le principali misure di profilassi e di igiene ambientale, previste in caso di malattia infettiva quale la scarlattina.

**Misure di profilassi:**

- sottoporsi alla sorveglianza sanitaria, al fine di rilevare eventuali sintomi quali mal di gola e febbre;
- solo in caso di insorgenza di sintomi, essendo una malattia contagiosa, è bene consultare il medico;

**Misure di igiene ambientale:**

- aerare i locali più frequentemente e disinfettare i pavimenti delle aule, i banchi, i piani di lavoro ed i giocattoli con prodotti disinfettanti di uso comune.

Si fornisce, inoltre, nell'ambito di un'azione condivisa di educazione alla salute della comunità scolastica, una sintetica informativa sulla scarlattina.

**DEFINIZIONE** La scarlattina è una malattia infettiva batterica dovuta allo Streptococco beta emolitico di gruppo A.

**DESCRIZIONE**- Come ci si contagia. Ci si contagia da persona a persona, tramite le goccioline respiratorie di saliva, per contatto diretto con un soggetto infetto emesse con la tosse, gli starnuti o anche semplicemente parlando. Un soggetto è molto contagioso durante la fase acuta della scarlattina, è poco infettante nel periodo che precede la malattia, e non lo è più dopo 24-48 ore dall'inizio della terapia antibiotica.

**Periodo di incubazione.** In seguito al contagio, lo Streptococco si moltiplica nella gola senza dare disturbi per 1-3 giorni, poi la malattia si manifesta.

**Contagiosità.** In genere i primi sintomi compaiono dopo 1-3 giorni dal contagio. Di norma un malato è contagioso da 1-2 giorni prima dell'inizio dei sintomi e per tutta la durata della malattia; se viene instaurata un'adeguata terapia antibiotica, dopo 48 ore il soggetto non è più contagioso.

**La prevenzione.** L'unico sistema per evitare la scarlattina è quello di tenere lontano i soggetti sani dalle persone già contagiate. Per proteggersi dall'infezione, inoltre, è importante lavarsi

spesso le mani con acqua e sapone, non condividere asciugamani, lenzuola, utensili ed altri oggetti personali con persone malate. Inoltre è opportuno evitare occasioni di scambio tra gli alunni di cibo, bevande, posate e tovaglioli.

**Riammissione a scuola.** Un bambino può tornare in comunità non prima di 48 ore dall'inizio della terapia antibiotica, in ogni caso quando ritorna ad essere in buone condizioni di salute, attestate da regolare certificato medico di pronta guarigione, da consegnare a scuola.

**Per la riammissione a scuola è necessario che i genitori consegnino a scuola il certificato del medico curante che attesti la guarigione del/la proprio/a figlio/a.**

**La Dirigente Scolastica**  
**Prof.ssa Anna Filomena De Simone**  
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993